

PRZYKŁADY RECEPT – LEKI RECEPTUROWE

Zwracamy uwagę, że przedstawione tu przepisy na leki recepturowe są jedynie przykładowe, natomiast decyzję odnośnie składu leku, stężenia substancji czynnych oraz zastosowania u konkretnego pacjenta – podejmuje każdorazowo lekarz, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

SUBSTANCJA: **Clotrimazolum**

Ulotka 07.2019

Zastosowanie na skórę

Rp: łojotokowe zapalenie skóry

Clotrimazoli 5,0

Zinci oxidi

Talci aa 20,0

Glyceroli 30,0

Ethanoli 60% ad 100,0

M.f. susp.

D.S. Smarować miejsca zmienione chorobowo 2-3 x dziennie

Rp: łupież pstry

Clotrimazoli 5,0

Eucerini

3% Sol. Ac. borici aa ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Smarować miejsca zmienione chorobowo 2 x dziennie

Rp: łupież pstry

Clotrimazoli 2,0

Ac. salicylici 1,0

Glyceroli 10,0

Ethanoli 96% ad 100,0

M.f. sol.

D.S. Do przemywania 2 x dziennie



Rp: Wyprzenia drożdżakowe

Clotrimazoli 3,0
Cupri sulfatis
Zinci sulfatis aa 0,05
Lanolini anhydrici
Aquae aa 12,5
Zinci oxidi 25,0
Vaselini albi ad 100,0
M.f. ung.
D.S.: 2 x dziennie smarować chore miejsca

Rp: Grzybica stóp międzypalcowa

Clotrimazoli 0,5
Talci
Zinci oxidi aa ad 100,0
M.f. pulv.
D.S.: Na skórę 2 x dziennie

Rp: Mieszane zakażenia skóry

Clotrimazoli
Metronidazoli aa 1,0
Glyceroli 5,0
Pentravani ad 100,0
M.f. ung.
D.S. Na skórę 2 x dzienni

Zastosowanie na śluzówkę

Rp: Zmiany grzybicze w jamie ustnej

Clotrimazoli 2,0 - 5,0
5% sol. Borax c. glycerini ad 100,0
M.f. susp.
D.S. Pędzlować chore miejsca w jamie ustnej

Rp: Globulki dopochwowe

Clotrimazoli 0,5
Neomycini sulf. 0,1
Sacchari lactatis 0,1
Acidi borici 0,02
Cacao olei q.s.
M.f. glob. vag. D.t.d. N° 12
D.S. 1 x dziennie na noc dopochwowo



Rp: Krem ginekologiczny

Clotrimazoli 2,0
Benzocaini 2,0
Gentamycini sulf. 0,04
Lekobazae LUX ad 100,0
M.f. ung.
D.S. 1 x na noc

Clotrimazolium pulvis pro receptura

Poradnik Receptury Współczesnej cz.

Zastosowanie na skórę:

Rp.: Płyn na łupież pstry

Clotrimazoli pulvis pro receptura 2,0
Ac. salicylici 1,0
Glyceroli 10,0
Ethanoli 96% ad 100,0
M.f.sol.
D.S. Do przemywania 2 x dziennie

Rp.: Krem na łupież pstry

Clotrimazoli pulvis pro receptura 5,0
Eucerini
3% sol. Acidi borici aa ad 100,0
M.f.ung
D.S. smarować miejsca zmienione chorobowo 2 x dziennie

Rp.: Zmiany z suchą skórą .

Clotrimazoli pulvis pro receptura 0,5
Talci veneti
Zinci oxidi aa 7,5
Gliceroli 10,0
3% Sol. Acidi borici
Aquae dest. aa ad 100,0
M.f. pulv.
D.S.: na skórę 2 x dziennie.

Rp: Zmiany z wilgotną skórę

Clotrimazoli pulvis pro receptura 0,4
Talci
Zinci oxidi aa ad 80,0
M.f. pulv.
D.S.: na skórę 2 x dziennie.



Rp: Łojotokowe zapalenie skóry

Clotrimazoli pulvis pro receptura 5,0

Zinci oxidi

Talci aa 20,0

Glyceroli 30,0

60% Ethanoli ad 100,0

M.f. susp.

D.S.: Smarować miejsca zmienione chorobowo 2 x dziennie

Rp: Mieszane zakażenia skóry

Clotrimazoli pulvis pro receptura

Metronidazoli aa 1,0

Glyceroli 5,0

Pentravani ad 100,0

M.f. ung.

D.S.: Na skórę 2x dziennie.

Rp: Grzybica stóp międzypalcowa

Clotrimazoli pulvis pro receptura 0,4

Talci

Zinci oxidi aa ad 80,0

M.f. pulv.

D.S.: Na skórę 2x dziennie.

Rp: Wyrznięcia drożdżakowe

Clotrimazoli pulvis pro receptura 3,0

Cupri sulfatis

Zinci sulfatis aa 0,05

Lanolini anhydrici

Aquae aa 12,5

Zinci oxidi 25,0

Vaselini albi ad 100,0

M.f. ung.

D.S.: 2x dziennie smarować chore miejsca.

Zastosowanie na śluzówkę

Rp: Krem ginekologiczny

Clotrimazoli pulvis pro receptura 2,0

Benzocaini 2,0

Gentamycini 0,04

Lekobazae LUX ad 100,0

M.f. ung.

D.S.: 1 x na noc



Rp.: Zmiany grzybicze w jamie ustnej

Clotrimazoli pulvis pro receptura 2,0-5,0

5 % sol. Borax c. glycerini ad 100,0

M.f. susp.

D.S. Pędzlować chore miejsca w jamie ustnej

Rp: Globulki dopochwowe

Clotrimazoli pulvis pro receptura 0,5

Neomycini 0,1

Sacchari lactatis 0,1

Acidi borici 0,02

Cacao olei q.s.

M.f. glob. vag. D.t.d. N° 12

D.S.: 1x dziennie na noc dopochwowo.